
Échantillonnage d'organismes – Bonaventure

Piège à crustacé 1 (récolté le 8 juin 2004, 13h30)

Crevette de sable (<i>Crangon septemspinosa</i>)	1
Épinoche à trois épines (<i>Gasterosteus aculeatus</i>) ¹	67
Gammare (<i>Gammarus sp</i>)	-
Nassaire (<i>Nassarius sp</i>)	-

Piège à crustacé 2 (récolté le 8 juin 2004, PM)

Épinoche à trois épines (<i>Gasterosteus aculeatus</i>) ¹	43
------------------------------------------------------------------------	----

Bourolle (récolté le 8 juin 2004, 13h15)⁴

Crevette de sable (<i>Crangon septemspinosa</i>)	7
----------------------------------------------------	---

Piège à amphipode (récolté le 8 juin 2004, PM)

Gammare (<i>Gammarus sp</i>)	1
--------------------------------	---

Senne à menés (8 juin 2004)

Crevette de sable (<i>Crangon septemspinosa</i>)	-
Épinoche à neuf épines (<i>Pungitius pungitius</i>)	1
Épinoche à quatre épines (<i>Apeltes quadracus</i>)	10
Épinoche à trois épines (<i>Gasterosteus aculeatus</i>) ¹	772
Épinoche tachetée (<i>Gasterosteus weathlandi</i>)	2
Littorine (<i>Littorina sp</i>)	-

Piège à crustacé 1 (récolté le 9 juin 2004, 13h50)

Épinoche à trois épines (<i>Gasterosteus aculeatus</i>) ¹	53
Gammare (<i>Gammarus sp</i>)	-
Larve de libellule (<i>Odonata</i>)	1

Piège à crustacé 2 (récolté le 9 juin 2004, 13h30)

Épinoche à trois épines (<i>Gasterosteus aculeatus</i>) ¹	18
Gammare (<i>Gammarus sp</i>)	-
Groseille de mer	3
Littorine (<i>Littorina sp</i>)	-

Bourolle 1 (récolté le 9 juin 2004, 14h)

Crevette de sable (<i>Crangon septemspinosa</i>)	2
Épinoche à trois épines (<i>Gasterosteus aculeatus</i>) ¹	204
Gammare (<i>Gammarus sp</i>)	-

Bourolle 2 (récolté le 9 juin 2004, 13h35)

Crevette de sable (<i>Crangon septemspinosa</i>)	2
Épinoche à trois épines (<i>Gasterosteus aculeatus</i>) ¹	156

Piège à amphipode (récolté le 9 juin 2004, 13h45)	
Gammare (<i>Gammarus sp</i>)	2
Filet ichtyologique dans la zostère 1 (10 juin 2004)^{2,3}	
Filet ichtyologique dans la zostère 2 (10 juin 2004)²	
Piège à crustacé (récolté le 14 septembre 2004, 12h50)	
Bourolle (récolté le 14 septembre 2004, 13h35)	
Choquemort (<i>Fundulus heteroclitus</i>)	2
Crevette de sable (<i>Crangon septemspinosa</i>)	9
Épinoche à trois épines (<i>Gasterosteus aculeatus</i>)	5
Mysis (<i>Mysis sp</i>)	1
Piège à amphipode (récolté le 14 septembre 2004, 12h45)	
Senne à menés (14 septembre 2004, 14h)	
Capucette (<i>Menidia menidia</i>)	1
Choquemort (<i>Fundulus heteroclitus</i>)	4
Crevette de sable (<i>Crangon septemspinosa</i>)	7
Épinoche à neuf épines (<i>Pungitius pungitius</i>)	4
Épinoche à quatre épines (<i>Apeltes quadracus</i>) ⁶	11
Épinoche à trois épines (<i>Gasterosteus aculeatus</i>) ⁵	39
Littorine (<i>Littorina sp</i>)	1
Poulamon Atlantique (<i>Microgadus lomcod</i>)	1

1. Présence de parasites sur certains individus.

2. Le filet, attaché à l'avant est tiré par la chaloupe qui recule.

3. Le filet est resté immobile un moment à la fin du trait.

4. La bourolle a été emporté par le courant et retrouvé un peu en dehors du barachois.

5. Il s'agit de jeunes de l'année.

6. Adultes et jeunes de l'année.